


PAUTAS Y RECOMENDACIONES DE LAS FEDERACIONES DE CAZA PARA LA GESTIÓN DE LA MIXOMATOSIS EN LA LIEBRE

La mixomatosis es una enfermedad que en ningún caso causa problemas para la salud pública al no ser una zoonosis, y por tanto **sin posibilidad de transmisión al ser humano.**

La transmisión de la enfermedad puede ocurrir de manera directa a través del contacto entre ejemplares enfermos y susceptibles, pero sobre todo por vía indirecta por medio de artrópodos hematófagos (mosquitos y pulgas) que actúan como vectores de la enfermedad.

La terramicida o productos similares no están científicamente probados en el tratamiento de la enfermedad.



COMUNICA

Cualquier novedad que pueda producirse sobre posible curación natural de ejemplares, la evolución en más o en menos de los niveles de mortandad, la expansión a zonas donde todavía no está constatada su existencia y cualquier dato de relevancia, pueden comunicarlo a las Federaciones de Caza Autonómicas.

RETIRA

Se recomienda retirar del campo los ejemplares muertos que se encuentren, siguiendo el protocolo aprobado por la consejería competente, a fin de evitar potenciales focos de contagio.

REDUCE

Dentro de la capacidad de autogestión de cada acotado, en aquellos cotos donde el índice de mortandad sea importante, se recomienda reducir las capturas, no cazando la liebre con la escopeta y reduciendo los cupos para la caza con galgo. De manera tal que queden más ejemplares vivos que pudieran desarrollar algún tipo de inmunidad de forma natural, muestra clara del compromiso de los cazadores con la conservación y con el ejercicio de una caza sostenible.

EVITA

Hemos de evitar el desplazamiento de cadáveres de animales infectados, así como tener cuidado en los desplazamientos de los propios cazadores de zonas infectadas a zonas no infectadas, dado que puede transportarse el virus de una zona a otra.

